

Efterstær

Indledning Ved en grå stær operation efterlades en tynd membran, som man placerer den nye kunstige linse i. Denne membran kan i ca. 10% af tilfældene blive uklar i løbet af de kommende måneder til år. Hvis uklarhederne bliver af et sådant omfang, at de påvirker synet, kan man vælge at fjerne dem ved hjælp af laser-stråler. Dette er et smertefrit og kortvarigt indgreb, som ikke kræver andet end lokal dråbe bedøvelse.

Før behandlingen Forundersøgelse kan udføres umiddelbart før behandlingen, som ikke kræver nogen særlige foranstaltninger. Der dryppes med pupiludvidende dråber 1/2 time før.

Bedøvelse De vil blive dryppet med pupiludvidende dråber 1/2 time før.

Behandlingen Behandlingen er smertefri og tager ca 10 min. Laserstrålen fokuseres på efterstæren og der "skydes" hul i membranen med en række skud.

Efter behandlingen De kan tage hjem umiddelbart efter indgrebet. Der er ikke behov for efterbehandling. De kan være generet af lyset, HUSK derfor solbriller. Der kan være lidt fluer for øjet i et par uger.

Transport De må ikke selv køre bil samme dag.

Senfølger og eventuelle komplikationer Der kan en sjælden gang opstå nethindeløsning i efterforløbet, men risikoen anses ikke for større end ved den primære grå stær operation. Der kan opstå hævelse af den gule plet men det er yderst sjælden.

Øjenlæge/kirurg Susanne Tvede Andersen Nørregade 8, 4100 Ringsted

TLF:74 62 25 04/25 75 30 30 Telefontid man-fredag 9-11

Akut lægevagt 70 15 07 00

Skadestue 70 15 07 08