

Operation for indad drejet øjenlåg

Indledning

Operationen kan vare op til 75 minutter. Jeg opererer kun et øjenlåg ad gangen.

Før operationen

For at sikre at det bløder mindst muligt skal du pausere med din blodfortyndende medicin inden operation:

Hjertemagnyl 1 uge inden operation
Marvan
INR skal være under 2
Clopidogrel, Plavix 5 dage inden operation
Xarelto 3 dage inden operation

Du skal også pausere/stoppe med naturmedicinen: Gingo Biloba, fiskeolie og hvidløgpiller. Evt købe en kølebrille, der har kølende effekt og afhjælper hævelser.

Købe Kloramfenikolsalven 1% på apoteket.

Du må gerne tage: pamol, Panodil, og Pinex På operationsdagen inden operationen må du gerne spise og drikke, dog ikke alkohol.

Du vil blive tilbudt en beroligende pille Halcion 0,125mg inden operationen, derfor anbefales det ikke at køre bil efter operationen.

Bedøvelse

Operationen foregår i lokalbedøvelse og er derfor smertefri. Bedøvelsen sprøjtes ind under huden i det nedre øjenlåg og på siden af øjet.

Operationen

Operationssygeplejersken renser huden omkring øjnene. Når jeg opererer dig for indad drejet øjenlåg strammer jeg i de fleste tilfælde den muskel op som holder øjenlåget stabilt. Når den muskel bliver slap vender øjenlåget enten indad som i dit tilfælde eller udad. Derefter afkorter jeg øjenlåget og strammer det op.

Efter operationen

Du skal ligge en time med et koldt omslag på det øjenlåg eller de øjenlåg der er opereret. Du må ikke køre bil samme dag pga. den beroligende pille. Du skal smøre operationssåret med kloramfenikolsalve 1% 3 gange dagligt. Recept er sendt til serveren og kan hentes alle steder. Benyt evt. kølebrillerne 3-5 gange dagligt for at mindske hævelser.

Kontrol: Trådende fjernes 10-14 dage efter operationen ved kontrollen.

Øjenlæge/kirurg Susanne Tvede Andersen Nørregade 8, 4100 Ringsted

TLF:74 62 25 04/25 75 30 30 Telefontid man-fredag 9-11

Akut lægevagt 70 15 07 00

Skadestue 70 15 07 08

