

Efterstær



Ved en grå stær operation efterlades en tynd membran, som man placerer den nye kunstige linse i. Denne membran kan i nogle tilfælde blive uklar.

Omkring 10% af dem der opereres for grå stær, udvikler efterfølgende efterstær.

Efterstær udvikles typisk de første år efter en grå stær operation, men kan også komme mange år efter.

Efterstær viser sig typisk på samme måde som grå stær. Symptomerne kan være: sløret, uklart syn og/eller forringet synsevne.

Behandlingen er tilskudsberettiget via den offentlige sygesikring til dette indgreb.

Ønsker du vurdering, om du er tilskudsberettiget til denne operation, kan du bestille en tid ved en almen praktiserende øjenlæge, eller booke konsultationstid med vores øjenlæge her i klinikken.

Før behandlingen

Forundersøgelse kan udføres umiddelbart før behandlingen, som ikke kræver nogen særlige foranstaltninger.

Du vil grundigt blive undersøgt af den øjenlæge der skal foretage behandlingen af efterstær.

Behandlingen

Der dryppes med pupiludvidende dråber ½ time før behandlingen.

Behandlingen er smertefri og kræver kun lokal dråbebedøvelse.

Behandlingen foregår i siddende stilling. Øjenlægen kigger gennem det mikroskop, som er udstyret med den laser der fjerner efterstæren.

Behandlingen tager ca. 2-5 min. pr. øje.

Efter behandlingen

Du kan tage hjem umiddelbart efter behandlingen.

De pupiludvidende dråber vil påvirke dit syn de efterfølgende timer, du må derfor ikke selv køre bil.

Det anbefales også at du medbringer et par solbriller, da du kan være generet af lyset.

Efterfølgende kontrol er sjældent nødvendigt.

Der er ikke behov for øjendråber efter behandlingen.

Senfølger og eventuelle komplikationer

Der kan i yderst sjældne tilfælde opstå komplikationer efter behandling for efterstær. Der er i yderst sjældne tilfælde væskeansamling i nethinden og nethindeløsning. Risikoen for nethindeløsning anses ikke for større end ved den primære grå stær operation.

Symptomer på nethindeløsning

- Lysglimt.
- En skygge eller gardin, der ikke flytter sig i kanten af synsfeltet.
- Pludselig eller forøgelse af fluer/myg i synsfeltet.
- Pludselig opstået uklarheder/sløret syn.

Oplever du ovenstående symptomer skal du kontakte øjenlægen.

Kontakt

Ringsted Øjenklinik

Nørregade 8

4100 Ringsted

Telefon: 25 75 30 60

mandag – torsdag: 8-15

fredag: 10-13

Udenfor åbningstiderne kontakt:

Lægevagten: 1818