

Operation af indadvendt øjenlåg (entropion)



Et indadvendt øjenlåg er en tilstand der skyldes forandringer i huden og bindevævet omkring øjet, som med alderen gradvist bliver svækket.

Den tilstand kan i nogle tilfælde resultere i at det nedre øjenlåg kommer til at vender indad og øjenvipperne vil her irritere øjet.

Tilstanden ses også ved yngre personer efter skade eller betændelsestilstande i øjet.

De mest hyppige symptomer udadvendt øjenlåg er:

- Irritation.
- Rødme.
- Tåreflåd/øget tåreflåd (øjet løber i vand).
- Øjenbetændelse.
- Sår på hornhinden

I fleste tilfælde kan man få tilskud via den offentlige sygesikring til dette indgreb.

Ønsker du vurdering, om du er tilskudsberettiget til denne operation kan du bestille en tid ved en almen praktiserende øjenlæge, eller booke konsultationstid med vores kirurg her i klinikken.

Før operationen

Forholdsregler

Inden operationen må du gerne spise og drikke, dog ikke alkohol.

Du må gerne tage: Pamol, Panodil, og Pinex på operationsdagen. Du skal pausere/stoppe med naturmedicinen: Gingo Biloba, fiskeolie og hvidløgspiller

Tager du blodfortyndende medicin skal du at pausere/stoppe med det inden operationen for at sikre at det bløder mindst muligt og derved markant mindske de komplikationer der er forbundet ved dette indgreb.

- **Hjertemagnyl** – pausere 1 uge inden operation. Rødme.
- **Plavix** – pausere 5 dage inden operation.
- **Xarelto** – pausere 3 dage inden operation.
- **Marevan** INR skal være under 2.

Vi anbefaler at du i snakker med din praktiserende læge inden du pauserer med blodfortyndende medicin.

Ved ankomst på operationsdagen vil du blive tilbudt en beroligende pille Halcion 0,125 mg. Inden operationen. Pille vil hjælpe dig til at kunne slappe af under operationen og virkningen indtræder allerede efter 15-30 minutter.

Bedøvelse

Operationen foregår ambulantly og i lokalbedøvelse.

Bedøvelsen sprøjtes ind under huden i de nedre øjenlåg. Du skal i minimum ligge med bedøvelsen i en halv time inden operationen. Du vil også blive dryppet i dryppet i øjet/øjnene med bedøvende dråber

Operationen

Operationen tager i gennemsnit 40-50 min. per øje. Skal begge øjne opereres vil dette i fleste tilfælde foregå samme dag.

Efter operationen

Du kan tage efter umiddelbart efter operationen.

Vi fraråder dog bilkørsel samme dag efter operationen.

Kirurgen vil efterfølgende udskrive en recept på Klorambenikolsalve 1%, som du kan afhente på et vilkårligt apotek. Med en vatpind smøres Klorambenikolsalve 1% på 3 gange dagligt i en uge.

Relativt hurtigt efter operationen kan øjenomgivelserne hæve op og eventuelt blive misfarvet. For at mindste hævelse og misfarvningen anbefales det at du bruger en kølende pose eller kølebrille 3-5 dagligt.

Kontrol

Trådene fjernes 10-14 dage efter operationen ved kontrollen.

Senfølger og eventuelle komplikationer

Alle operationer er forbundet med en risiko for komplikationer. Ved en operation for indadvendt øjenlåg er risiko for komplikationer dog yderst sjældne. De risici der er forbundet med operationen kan være - blødning, misfarvning, betændelse.

I nogle tilfælde kan der de første dage efter operationen opstå så meget hævelse, at trådene sprænger. Er dette tilfældet bedes du kontakte klinikken.

Ringsted Øjenklinik
Øjenlæge/Kirurg
Susanne Tvede Andersen
Nørregade 8
4100 Ringsted

Telefon: 25 75 30 60
mandag - torsdag: 8-15
fredag: 10-13
Udenfor åbningstiderne kontakt:
Lægevagten: 1818